TUTT, J. W., Secondary sexual characters in *Lepidoptera*. London. 1892. 24 pg.
———, Stray notes on the *Noctuæ*. London. 1892. 24 pg.
WEBSTER, F. M., Butterflies common to Norway and Arctic North America. London. 1894. 4 pg. (Af S. LAMPA).
Insekternas historia. En bok för den vetgiriga ungdomen. Stockholm. 1867. 146 pg. (Af densamme).

Chr. Aurivillius.

NOGLE FOR NORGES FAUNA NYE HEMIPTERA HETEROPTERA.

AF

H. WARLOE.

Odontoscelis fuliginosus L. Fundet i flere eksemplarer $^{14}/_{7}$ 1894 paa Ringerike.
Scolopostethus pictus SCHILL. Fundet talrig ved Dröbak[1] om vaaren under tör tang og mellem stene paa stranden.
Taphropeltus contractus H.-SCH. Et eks. $^{11}/_{4}$ —94.
Tropistethus holosericeus SCHOLZ. Et eks. $^{23}/_{4}$ — 95.
Pterotmetus staphylinoïdes BURM. Flere eks. blandt *Calluna vulgaris*.
Macrodema micropterum CURT. Et eks. $^{14}/_{10}$ —93.
Acompus rufipes WOLFF. Flere eks. paa fugtige steder.
Stygnocoris arenarius HAHN. Et eks. $^{6}/_{6}$ —94.
Trapezonotus distinguendus FLOR. To eks. under tang paa stranden $^{24}/_{5}$ —94.
Aradus laeviusculus REUT. Et eks. $^{13}/_{10}$ — 93.
Aneurus laevis FABR. Et eks. paa *Betula* $^{29}/_{6}$ —93.
Notostira erratica L. Ikke sjelden.
Phytocoris pini KIRSCHB. Flere eks. paa *Pinus*.
Calocoris striatellus FABR. Et eks. $^{27}/_{6}$ —95.
Pilophorus bifasciatus FABR. Almindelig paa *Pinus*.
Pithanus Märkelii H.-SCH. Den kortvingede form almindelig blandt græs baade ved Dröbak og Gjövik. Den langvingede form har jeg ikke fundet.
Eroticoris rufescens BURM. Et kortvinget eks. $^{28}/_{6}$ —95.
Globiceps flavonotatus BOH. Flere eks. paa *Quercus*.

Foruden disse for Norges fauna nye har jeg ved Dröbak taget de fleste i landet tidligere fundne arter, hvoraf jeg her kun skal nævne:
Pentatoma pinicola MULS. Et eks. paa *Pinus*.
Alydus calcaratus L. Et eks. $^{18}/_{8}$ —94.

Disse to arter er för taget af professor BOHEMAN.

---

[1] Hvor intet findested er angivet er det Dröbak.